

DPT-IPV (ジフテリア・破傷風・百日咳・ポリオ) 四種混合ワクチン

	DTaP (ジフテリア・破傷風・百日咳) 三種混合ワクチン					IPV 不活化ポリオワクチン				
	①	②	③	④	追加	①	②	③	④	追加
アメリカ	2ヶ月	4ヶ月	6ヶ月	1歳3ヶ月~ 1歳6ヶ月	4歳~6歳	2ヶ月	4ヶ月	6ヶ月~ 1歳6ヶ月		4歳~6歳
フランス 2015~	2ヶ月	4ヶ月	11ヶ月		6歳	2ヶ月	4ヶ月	11ヶ月		6歳
フランス ~2014	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月		1歳4ヶ月~ 1歳6ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月		1歳4ヶ月~ 1歳6ヶ月
スウェーデン	3ヶ月	5ヶ月	12ヶ月		5歳	3ヶ月	5ヶ月	12ヶ月		5歳
ドイツ	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月		12ヶ月	2ヶ月	4ヶ月	12ヶ月	18ヶ月	3歳
イギリス	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月		3歳	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月		3歳
日本の多くの医療機関	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月		1歳4ヶ月~ 1歳10ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月		1歳4ヶ月~ 1歳10ヶ月
中澤小児科	3ヶ月	5ヶ月	7ヶ月 * 11ヶ月		# 1歳6ヶ月 ~ 3歳	3ヶ月	5ヶ月	7ヶ月 * 11ヶ月		# 1歳6ヶ月 ~ 3歳

ワクチンの接種間隔を空ける程効果が高く長持ちします。

* 出来れば11ヶ月時にB型肝炎3回目と共に

出来れば3歳児健診の直前に

	Hib ヘモフィルス・インフルエンザ菌B型ワクチン				PCV13 13価肺炎球菌ワクチン				Hep B B型肝炎ワクチン			
	①	②	③	追加	①	②	③	追加	①	②	③	④
アメリカ	2ヶ月	4ヶ月	6ヶ月	12ヶ月~ 1歳3ヶ月	2ヶ月	4ヶ月	6ヶ月	12ヶ月~ 1歳3ヶ月	0ヶ月	1ヶ月~ 2ヶ月	6ヶ月~ 1歳6ヶ月	
フランス 2015~	2ヶ月	4ヶ月		11ヶ月	2ヶ月	4ヶ月		11ヶ月	2ヶ月	4ヶ月	11ヶ月	
フランス ~2014	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	1歳4ヶ月~ 1歳6ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	1歳4ヶ月~ 1歳6ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	1歳4ヶ月~ 1歳6ヶ月	
スウェーデン	3ヶ月	5ヶ月		12ヶ月	3ヶ月	5ヶ月		12ヶ月				
ドイツ	2ヶ月	4ヶ月	12ヶ月	2歳	2ヶ月	4ヶ月		12ヶ月	2ヶ月	4ヶ月	12ヶ月	1歳6ヶ月
イギリス	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	12ヶ月	2ヶ月	4ヶ月		12ヶ月				
日本の多くの医療機関	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	1歳~ 1歳5ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	12ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	7ヶ月~ 8ヶ月	
中澤小児科	2ヶ月	4ヶ月	6ヶ月	1歳1ヶ月	2ヶ月	4ヶ月	6ヶ月	12ヶ月	2ヶ月	4ヶ月	11ヶ月	

ドイツでは3種混合にB型肝炎、不活化ポリオ、Hibを加えた4種混合、5種混合、6種混合を使うのが一般的で、3ヶ月の3種混合の時に4種混合、5種混合、6種混合のうちのどれかを使っても良いことになっているので、3ヶ月でIPV、Hib、HepBをすることになっているような表が多く出回っている。